



## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.26/404 /O/ 03.07.2018

**1.MAR,PAR** – se recomanda efectuarea tratamentului fitosanitar impotriva:  
**VIERMELE PRUNELOR** (*Cydia funebrana* – generatia II-a), tantarusul frunzelor  
(*Dasineura mali*,pyri),afide,**RAPAN** (*Venturia i.pirina*),**MONILIOZA** (*Monilinia l.*),

➤ Un insecticid:

<b>KARATE ZEON</b>	<b>0.015 %</b>	<b>sau</b>
<b>NOVADSIM PROGRESS</b>	<b>0.1%</b>	<b>sau</b>
<b>CALYPSO 480 SC</b>	<b>0.02%</b>	<b>sau</b>
<b>DECIS 25 WG</b>	<b>0.003%</b>	<b>sau</b>
<b>LAMDEX 5 EC</b>	<b>0.015%</b>	<b>sau</b>
<b>CORAGEN SC</b>	<b>0,150 L/HA</b>	

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.

### Asociat cu :

➤ un fungicid (rapan si fainare) :

<b>IMPACT 25</b>	<b>0.015%</b>	<b>sau</b>
<b>FOLICUR SOLO</b>	<b>0.04%</b>	<b>sau</b>
<b>TOPSIN 70 WDG</b>	<b>0.07%</b>	<b>sau</b>
<b>FLINT PLUS</b>	<b>0.125%</b>	

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.

Se recomanda efectuarea a doua tratamente

Tratamentul I – 03-07.07.2018

Tratamentul II – 12- 16.07.218

### OBSERVATII:

- Se vor citi cu atentie instructiunile de utilizare de pe etichetele produselor de protectia plantelor;
- Daca pe frunze se constata prezenta a 3-5 forme mobile de acarieni ,in solutia de stropit se adauga un acaricid:Ortus 5 SC concentratie 0,1% sau Vertimec

1,8 EC concentratie 0,1% sau Milbeknock EC concentratie 0,05% sau alte acaricide omologate;

- Daca exista infectii de Erwinia amylovora- focul bacterian al rozaceelor- se va folosi un fungicid pe baza de cupru (Funguran OH 300 SC conc.0.04% sau Champ 77 WG conc.0.2% sau Kocide 2000 conc,0.25% sau Triumf 40 WG conc.0.25% sau Bouillie bordelaise conc.0.5%),tratamentul efectuandu-se dupa igienizarea pomilor.Se va acorda o atentie deosebita dezinfectarii instrumentelor folosite la taiat,utilizandu-se in acest scop solutie de hipoclorit.
- Tratamentul sa se execute pe timp linistit (fara vant) .Trebuie evitate orele cu temperaturi peste 25 ° C.
- Daca intervin precipitatii in mai putin de 4 ore, tratamentul se va repeta.
- Produsele se solubilizeaza separat, ,se omogenizeaza,agitand continuu solutia si apoi se pulverizeaza pe toata coroana pomului (nu se lasa de la o zi la alta). Combinatiile intre produse se vor face respectand recomandarile de pe etichetele acestora.
- Concentratiile de utilizare a produselor de protectia plantelor indicate in buletinul de avertizare ,sunt calculate pentru un volum de solutie de 1000 l/ha.Cantitatea de produs comercial se va calcula pentru 1500 l/solutie pe hectar, chiar daca volumul de apa folosit va fi mai mic sau mai mare functie de tipul si varsta plantatiei,etc.
- Se vor respecta cu strictete normele de securitatea muncii, mediului, animalelor si albinelor;
- Este interzis pasunatul ca si folosirea ierbii in hrana animalelor timp de 7 zile in zona unde s-a efectuat tratamentul ;
- Pentru evitarea aparitiei raselor rezistente de boli si daunatori la un anumit produs,alternati-le fata de tratamentele precedente ;
- Respectati cu strictete timpul de pauza indicat pe eticheta produsului. **NU SE STROPESC POMII CU FRUCTE IN PARGA / COAPTE.**
- Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.
- Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute în Ordinul nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita plati în cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizarea produselor de protectia plantelor
- Tratamentele cu produse de protectie a plantelor nu se vor aplica în zonele de protectie a resurselor de apa, în zonele de protectie sanitară si ecologica precum si in alte zone stabilite in conditiile legii;
- Respectati cu strictete conditiile de depozitare,de manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor în exploatațiile agricole,asa cum sunt prevazute în Ghidul pentru utilizarea în siguranta a produselor de protectia plantelor ( <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-în-domeniul-fitosanitar.html>).
- Respectati condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațiile agricole, așa cum sunt prevăzute la cap. VI pct. 6.3-6.7 din Codul de bune practici în fermă.
- Pentru protectia familiilor de albine, in conformitate cu prevederile legale,respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Si

Alimentatiei,1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor,68/05.02.1992 al Ministerului Mediului,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor,veti lua toate masurile ce va revin.

## REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect. tratam (ziua luna, anul)	Parcela Bloc fizic	Timpul aplicarii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denu mire ppp folosit	Doza Omolo găță /doza folosită	Supra fața, (ha)	Cantit. utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura ( ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

**VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR.**

**COORDONATOR OF ,  
Ing.Smaranda Stefan**

**Intocmit,  
Ing.Cazacu Camelia**