



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA COMUNEI MALURENI
OFICIUL FITOSANITAR ARGES

Str. Calea Campulung, nr.4, Pitesti, Jud. Arges
email:unitateafitosanitaraarges@yahoo.com

JUDEȚUL ARGES
INTRARE - IEȘIRE

Nr. 4750 Din 07.06.2018

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.18/352/O/06.06.2018

DIFERITE SPECII POMICOLE SI ARBORICOLE – se recomanda aplicarea masurilor de combatere a daunatoruluiomidaparoasa a dudului (*Hyphantriacunea*) generatia I-a ,precumsi a altordefoliatoare, in parcuri si aliniamente, pomiimarginalidrumurilor principale si laterale, gospodariilepopulatiei, pomiizolati.

- **Masurimecanice:** taierea si distrugereacuiburilor de omiziprinarderesauintroducerea in vase cupetrol. Datoritafaptului ca aparitiaomizilor este esalonata se impune ca acestemasuri sa fie repetate de mai multeori la intervale de 3 - 4 zile.

Masurilemecanicevor fi completate cu:

- **Masurichimice** - tratamentefitosanitarecuunuldin insecticidele

- **Un insecticid:**

KARATE ZEON	0,015 %	sau
CALYPSO 480 SC	0,02%	sau
FASTAC 10 EC	0,02%	sau
KAISO SORBIE 5 WG	0,015%	

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.

Perioada optima de tratament:aparitia in cuiburi a larvelor de varsta - III-a

OBSERVATII:

- Se vor citi cu atentie instructiunile de utilizare de pe etichetele produselor de protectia plantelor;
- Tratamentul sa se execute pe timp linistit (faravant) pentru a evita deriva solutiei pe culturile invecinate;
- Nu se stropesc pomii cu fructe coapte sau in parga. Aplicati masurile mecanice de combatere.

- Se vor respecta cu strictete normele de securitatea muncii, mediului, animalelor si albinelor;
- Este interzis pasunatul ca si folosirea ierbii in hrana animalelor timp de 7 zile in zona unde s-a efectuat tratamentul ;
- Pentru protectia familiilor de albine, in conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor, veti lua toate masurile ce va revin.
- Documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatare, precum si registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, se pastreaza pe o perioada de cel putin 3 ani;
- Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatare agricole in conditiile stabilite de lege (cap. VI pct. 6.3-6.7 din Codul de bune practici in ferma);
- Conform Reg. CE nr.1107/2009, art.67,(1) , aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „Registrul de evidenta a produselor de protectie a plantelor”, dupa modelul

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Parcela Bloc fizic	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Ormologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cant. utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

COORDONATOR OF,

Ing.Smaranda Stefan

Intocmit,

Ing.Cazacu Camelia



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 19/ 353/O/ 06.06 .2018

1. PRUN si alte samburoase- se recomanda efectuarea tratamentului chimic pentru combaterea paduchelui din San Jose -- generatia I (*Quadraspidiotus* sp.) afide (*Aphis* sp.), si altidaunatori, monilioza (*Monilinia laxa*), cu urmatoarele produse:

- **Un insecticid:** pentru San Jose, afide

MOSPILAN 20 SG	0,03% - (0.300 Kg/Ha)	sau
CALYPSO 480 SC	0.02%	sau
ACTARA 25 WG	0,01% - (0,100Kg/Ha)	sau
RELDAN 22 EC	0,2 %	

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.

- **Asociat cu:** - un fungicid pentru monilioza

LUNA EXPERIENCE 400 SC	0,05 %	sau
BRAVO 500 SC	0,15%	sau
FOLICUR SOLO 250 EW	0.1%	

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.

Perioada optima de tratament: - cresterea fructului (dimensiunea unei alune) - tratamentul I;
Tratamentul II se repeta la 8- 10 zile.

OBSERVATII:

- Se vor citi cu atentie instructiunile de utilizare de pe etichetele produselor de protectia plantelor;
- **NU SE STROPESC POMII CU FRUCTE IN PARGA/COAPTE .**
- Tratamentul sa se execute pe timp linistit (faravant) .Trebuie evitate orele cu temperaturi peste 25 ° C.
- Produsele se solubilizeaza / dilueaza separat, dupa caz, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza.
- La efectuarea tratamentului II ,alternati produsele fata de tratamentul I.
- Concentratiile de utilizare a produselor de protectia plantelor indicate in buletinul de avertizare ,sunt calculate pentru un volum de solutie de 1000 l/ha.Cantitatea de produs comercial se va calcula pentru 1000 l/solutie pe hectar, chiar daca volumul de apa folosit va fi mai mic sau mai mare functie de tipul de livada, varsta plantatiei, etc.

- Se vor respecta cu strictete normele de securitatea muncii, mediului, animalelor si albinelor;
- Este interzis pasunatul ca si folosirea ierbii in hrana animalelor timp de 7 zile in zona unde s-a efectuat tratamentul ;
- Pentru protectia familiilor de albine, in conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor, veti lua toate masurile ce va revin.

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Parcela Bloc fizic	Timpul aplicării	Tratamentele efectuate					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea PPP folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața, (ha)	Cantitate utilizată (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL, PENTRU INFORMAREA TUTUROR.

COORDONATOR OF Intocmit,
Ing. Smaranda Stefan

Ing. Cazacu Camelia



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA
OFICIUL FITOSANITAR ARGES

Str. Calea Campulung, nr.4, Pitesti, Jud. Arges
email: unitateafitosanitaraarges@yahoo.com

PRIMĂRIA COMUNEI MĂLUREA
JUDEȚUL ARGES

INTRARE - IEȘIRE

Nr. 4752 Din 07.06.2018

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 20 /354/ O/ 06 .06 .2018

1.MAR - se recomanda efectuarea tratamentului chimic pentru combaterea paduchelui din San Jose – generatia I (*Quadraspidiotus* sp.) **afide** (*Aphis* sp.), **acarieni** (*Tetranychus* u.), omizi defoliatoare, **rapan** (*Venturia* i.), **fainare** (*Podosphaera* l.) **monilioza** (*Monilinia laxa*), cu urmatoarele produse:

➤ **Un insecticid: pentru San Jose, afide**

RELDAN 22 EC	0,15%	sau
MOSPILAN 20 SG	0,03% - (0.450 Kg/Ha)	sau
PYRINEX QUICK	0,1%	sau
ACTARA 25 WG	0,01%	sau
CALYPSO 480 SC	0,02%	

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.

Asociat cu:

➤ **Un fungicid pentru rapan , fainare .**

CLARINET	0,1 %	sau ²
FLINT PLUS 64 WG	0,125 %	sau
SCORE 250 EC	0,015 %	sau
TOPSIN 500 SC	0,14%	sau
STROBY DF	0,01 – 0,013 %	

Sau alte produse de protectia plantelor omologate..

Perioada optima de tratament: fructul cat nuca - tratamentul I;
Tratamentul II se repeta la 8-10 zile.

OBSERVATII:

➤ *Daca pe frunze se constata si prezenta a 5-10 forme mobile de acarieni, atunci in solutia de stropit se poate adauga si un acaricid:*

NISSORUN 10 WP	0,03%	sau
ENVIDOR 240 SC	0,04%	sau
MILBEKNOCK EC	0,05%	

➤ La tratamentul II- *nu se va mai adauga acaricid* in solutia de stropit, pentru ca timpul lor de actiune este mai mare.

- Se vor citi cu atenție instrucțiunile de utilizare de pe etichetele produselor de protecția plantelor;
- Tratatamentul sa se execute pe timp liniștit (faravânt) pentru a evita deriva soluției pe culturile învecinate;
- Produsele se solubilizează / diluează separat, după caz, se omogenizează și apoi se pulverizează.
- La efectuarea tratamentului II, alternați produsele față de tratamentul I.
- Se vor respecta cu strictețe normele de securitatea muncii, mediului, animalelor și albinelor;
- Concentrațiile de utilizare a produselor de protecția plantelor indicate în buletinul de avertizare, sunt calculate pentru un volum de soluție de 1500 l/ha. Cantitatea de produs comercial se va calcula pentru 1500 l/soluție pe hectar, chiar dacă volumul de apă folosit va fi mai mic sau mai mare funcție de tipul de livadă, varsta plantăției, etc
- Pentru protecția familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce va revin.

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Parcela Bloc fizic	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

VA RUGĂM, SĂ AFIȘATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL, PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

COORDONATOR OF Întocmit,

Ing. Smaranda Stefan

Ing. Cazacu Camelia